

## النيوجين القاري في منطقتي دمشق والقلمون (جنوب غرب سورية)

كايد معلولة<sup>(1)</sup>

تاريخ الإيداع 2014/05/22

قبل للنشر في 2014/06/30

### الملخص

قادت الدراسة التي أُجريت على توضعات النيوجين القارية في كل من منطقتي دمشق والقلمون إلى تمييز تشكيلتين ليتولوجيتين: تشكيلة سفلى مؤلفة من رسوبات حطامية ذات عناصر ناعمة بصورة عامة، يغلب فيها الرمل والغضار، تنتشر في قاعدتها محلياً بقايا صبة بركانية بازلتية؛ وتشكيلة عليا مؤلفة من رسوبات كونغلواميراتية ذات عناصر خشنة متباينة الحجم والمصادر. بينت الدراسة أن الصبات البركانية التي اندفعت من الجنوب، كصبة جبل المانع البازلتية في جنوب دمشق، بلغت الأطراف الجنوبية لحوض الديماس ولم تتعداها بعيداً نحو الشمال. كما بينت الدراسة أن عمر التوضعات القارية المستقرة فوق الصبات البركانية تعود في قواعدها السفلى إلى عمر الميوسين، وذلك مقارنة بمعطيات التحاليل النظائرية للصخور البركانية المسجلة سابقاً في المنطقة.

**الكلمات المفتاحية:** النيوجين، الميوسين، البليوسين، الستراتغرافيا، سورية.

<sup>(1)</sup> أستاذ، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمشق، سورية.

## The Neogene in Damascus and Kalamoun areas (SW Syria)

K. Maalouleh<sup>(1)</sup>

Received 22/05/2014

Accepted 30/06/2014

### ABSTRACT

The study of continental Neogene deposits in Damascus and Kalamoun areas has led to distinguish two lithological formations: the bottom one is composed of debris with fine elements in general, dominated by sand and clay, widespread on its base locally remnants of volcanic basalt flow. The top formation consist of conglomerate sediments with coarse elements of mixed sizes and sources.

The study showed that volcanic flow which came from the south as basaltic flow from Al-Manea Mountain to the south of Damascus, reached the southern part of Dimas Basin and not far beyond it towards the north.

Also, the study demonstrated that the age of the continental deposits overlying the volcanic flows belong at their bases to Lower Miocene age, in comparison with the data of the isotopic analysis of the volcanic rocks previously recorded in the region.

**Key words:** Neogene, Miocene, Pliocene, Stratigraphy, Syria

---

<sup>(1)</sup> Prof., Department of Geology, Faculty of Sciences, Damascus University, Syria.

## مقدمة

تعود أقدم الأراضي المكتشفة في منطقة الدراسة إلى منظومة الكريتاسي، إذ تبدو طبقات السينومانيان الأعلى الكلسية واضحة على جانبي وادي الربوة متوجة بتوضعات طابق التورونيان المؤلفة في قاعدتها من رسوبات مارنية كلسية غنية بمستحاثات من صفيحيات الغلاصم، معديات الأرجل والأمونيات التي من بينها النوع *Thomasites rollandi* المميز لعمر التورونيان (دوبرتريه، 1949، 1966). وعلى سفوح جبال قاسيون والمزة تنتشر على نطاق واسع توضعات الكريتاسي الأعلى المارنية ذات اللون الحوراي الأبيض المميز، متوجة بجرر الإيوسين والأوليغوسين الكلسية (دوبرتريه، 1949، 1966؛ بونيكاروف، 1967).

تستقر توضعات النيوجين القارية في منطقة الدراسة فوق الصخور الباليوجينية الكلسية (صخور الأوليغوسين الكلسية: جدار معلولا). وهي مؤلفة من رسوبات حطامية بمعظمها، نتجت من تأثير عوامل التعرية المناخية المختلفة في التضاريس التي برزت عقب الانسحاب البحري عن السطحة السورية في نهاية الباليوجين.

### الدراسات السابقة

عرض عدد من الجيولوجيين في السابق معلومات أولوية مهمة عن توضعات النيوجين القارية من خلال بعض الدراسات الإقليمية التي قاموا بها في المنطقة. من هؤلاء دوبرتريه (1949، 1966)؛ فاراجيف، (1966)؛ قربانوف وزارجينوف، (1966)؛ بونيكاروف وآخرون (1967)، سلوم (1996)، ندور (1985). وقد تناول بعض هذه الدراسات بالتفصيل الخصائص الكيميائية والمينيرالوجية للفلزات في التوضعات النيوجينية القارية وأهميتها الاقتصادية.

### هدف البحث


هدف هذا البحث إلى تحديد معالم التطور الجيولوجي لمنطقتي دمشق والقلمون خلال المرحلة الزمنية التي أعقبت طفو السطحة السورية بعد انسحاب البحر عنها في نهاية الباليوجين، وذلك من خلال دراسة التوضعات الرسوبية التي تكونت في هاتين المنطقتين بعد تلك المرحلة: معرفة طبيعة الرسوبات، وتغيراتها وتبدلاتها الليتولوجية والسحنية شاقولياً وأفقياً في الزمان والمكان.

### مواد البحث وطرقه

تعتمد طريقة البحث على رفع عدد من المقاطع الجيولوجية في مواقع متنوعة من منطقة الدراسة: المقطع الأول في أقصى الطرف الشمالي الشرقي من جبل قاسيون (جبل أبو العطا)، والمقطع الثاني في شمال بلدة معلولا، والمقطع الثالث في منطقة عين

الصاحب إلى الغرب من بلدة منين، والمقطع الرابع في منطقة عين الخضرا إلى الشمال الغربي من بلدة الهامة، والمقطع الخامس في منطقة الصبورة إلى الغرب من مدينة دمشق (شكل 1).

كما تعتمد طريقة البحث على جمع عينات صخرية من المقاطع التي رُفعت، والعمل من ثمَّ على تحليلها مخبرياً، وذلك بغية معرفة الخصائص الدقيقة للتوضعات النيوجينية ومحتواها من الفلزات والمستحاثات.



الشكل (1) خارطة مواقع منطقة الدراسة

الستراتغرافيا


منطقة دمشق

### 1 - النيوجين في منطقة أبو العطا

تتكشف توضعات النيوجين القاري على السفح الجنوبي من النهاية الغربية لجبل القطا، الملاصقة شمالاً مع جبل أبو العطا، في المنطقة المعروفة تحت اسم "طلوع التنايا"، حيث تستقر فوق سطح حتي شديد التحدد من جدار كلسي كتلي ثخين، معروف تحت اسم "جدار معلولا"، الذي يتميز بالنوع *Nummulites intermedius* من مستحاثات النموليتات المنتشرة في طبقاته الكلسية.

في منطقة "طلوع التنايا"، على الطرف الجنوبي من الطريق الرئيسي دمشق - النبك، قمنا برفع مقطع لتوضعات النيوجين القاري التي تتتابع فيه على النحو الآتي، من الأسفل إلى الأعلى (شكل 2):

- 1- طبقة حصوية، ذات عناصر متوسطة الحجم (2-5م)، ضعيفة التماسك، يتخللها غضار رملي، سيلتي..... 0.75 - 1.50 م
- 2- حجر رملي أحمر رمادي اللون، ناعم الحبات، ضعيف التماسك ..... 35- 40 م
- 3- تتابع من طبقات كونغولوميراتية ، ذات عناصر متوسطة الحجم، مع طبقات غضارية رملية سيلتية، بنية-رمادية اللون، وعدسات كلسية رملية رقيقة..... 3- 5 م
- 4- بازالت منفسخ، كتلي، تكهفي، تحتوي بعض الفجوات فيه على كالسيت ناعم التبلور، أبيض اللون. وهو ذو انتشار عدسي محدود جداً..... 20- 35م
- 5- حجر رملي أحمر إلى رمادي اللون، ناعم الحبات، ضعيف التماسك..... 20- 35 م
- 6- كونغولوميرا ذات عناصر متوسطة إلى كبيرة الحجم (5-15 سم)، غير مصقولة الرؤوس بشكل جيد. وهي على شكل طبقات ثخينة (3-5م)، تتناوب معها طبقات غضارية سيلتية ذات محتوى رملي، ثخينة نسبياً (1.5-2م)..... 45- 50م
- 7- كونغولوميرا ذات عناصر كبيرة الحجم (10-25 سم)، غير مصقولة الرؤوس، مستمرة دون انقطاع ظاهر حتى التشكيلات الرباعية..... 120 م



الشكل (2) مقطع النيوجين في منطقة جبل أبو العطا



الشكل (3) رمال النيوجين في منطقة جبل أبو العطا

تتميز في توضعات النيوجين القاري على الصعيد الليتولوجي في موقع جبل أبو العطا تشكيلتان:

- تشكيلة سفلى، مؤلفة بمعظمها من رمال كوارتزيتية حمراء مصفرة إلى رمادية اللون، بسبب المحاليل الحديدية الليمونيتية، ناعمة الحبات، تتخللها كتل من البازلت المتفسخ، فضلاً عن عدسات رقيقة، غضارية رملية أو حصوية أحياناً. تراوح ثخانة هذه التشكيلة من 110 إلى 150م (تشكيلة عطا\*). ونشير هذه التشكيلة إلى سحنة ريحية التوضع (شكل 3).

- تشكيلة عليا، مؤلفة بمعظمها من كونغولوميرا كبيرة العناصر، غير مصقولة الرؤوس بصورة عامة، وغير مصنفة الفرز. وتتخللها مستويات غضارية رملية متوسطة الثخانة. وتستمر هذه التشكيلة الكونغولوميرانية حتى التوضعات الرباعية دون انقطاع ظاهر (تشكيلة التنايا\*).

## 2- النيوجين في منطقة حوض الديماس

المنخفضات والأحواض بين الجبلية في سورية والمناطق المجاورة هي المراكز الرئيسية لتوضعات النيوجين القارية. ويعدُّ سهل الديماس حوضاً نيوجينياً بامتياز، ويقع إلى غرب - شمال غرب مدينة دمشق.


\* تسمية موضوعة من قبل معطي في بحث معد للتشر

تتكشف على سفوح الجبال المحيطة بحوض الديماس توضعات النيوجين القارية. وقد دُرست هذه التوضعات في موقعين رئيسيين: موقع الصبورة على الطرف الجنوبي من الحوض، وموقع عين الخضرا على الطرف الشمالي منه.

#### أ. مقطع الصبورة

على السفح الشمالي لجبل عنتر إلى الشمال من بلدة المعضية، وإلى الجنوب الغربي من بلدة الصبورة، يتكشف القسم الأسفل من توضعات النيوجين القارية. وقد سمح العديد من الآبار المحفورة في المنطقة، لغرض استثمار المياه الجوفية، بالكشف عن طبيعة هذه التوضعات التي هي، من الأسفل نحو الأعلى (شكل 4) :

- 1- صبة ثخينة من بازلت أوليفيني متفسخة على السطح العلوي.....35-50 م
- 2- كونغولوميرا ذات عناصر كبيرة من صخور كلسية وصخور بازلتية.....10-15 م
- 3- توضعات غضارية رملية تتخللها عدسات ثخينة أحياناً من كونغولوميرا كلسية متوسطة العناصر.....50-70 م
- 4- طبقات كلسية رملية صلبة.....6-7 م
- 5- توضعات غضارية وعضارية-رملية.....35-50 م
- 6- كونغولوميرا كتلية شديدة التماسك ذات ملاط كربوناتية..... < 50 م



الشكل (4) مقطع النيوجين في منطقة الصبورة



الشكل (5) بازلت متفسخ في قاعدة التوضعات النيوجينية بتماس مع جدار الباليوجين الكلسي في غرب منطقة المزة


إن الصبات البركانية المتدفقة من الجنوب، قد بلغت الأطراف الجنوبية لمناطق حوض الديماس (منطقة الصبورة)، وامتدت بعيداً في هذا الحوض، ولكنها لم تبلغ مع ذلك أطرافه الشمالية (منطقة عين الخضرا).

#### ب. مقطع عين الخضرا

في موقع عين الخضرا تتكشف التوضعات النيوجينية فوق جدار الباليوجين الأعلى الكلسية وعلى امتداد وادي نهر بردى جنوباً حتى قرية الهامة، وذلك على النحو الآتي، من الأسفل إلى الأعلى (شكل 6):

- 1- رمال كوارتزية ناعمة تتخللها مستويات رقيقة من الحجر الكلسي الرملي مع مستويات كونغلو ميراثية ..... 50-75 م
- 2- غضاريات حمراء وبنية اللون تتخللها مستويات حصوية ورملية وتضم قواقع من معديات الأرجل البحرية ..... 100م
- 3 - توضعات رملية تتناوب فيها مستويات غضارية رملية مع مستويات كونغلو ميراثية عدسية المظهر ..... 150م
- 4 - تناوب طبقات غضارية رملية مع توضعات من الرمل والحصى والمارن ..... 200م
- 5 - توضعات كونغلو ميراثية ثخينة مؤلفة من عناصر كبيرة الحجم وجماميد من الحجر الكلسي والصوان، وتتخللها مستويات غضارية رملية ..... 200-300م





الشكل (6) مقطع النيوجين في منطقة عين الخضرا



الشكل (7) التوضعات النيوجينية الكونغلوميرانية الحصوية على أطراف حوض الديرماس

أظهرت الآبار التي حُفرت في حوض الديماس أن التوضعات النيوجينية تزداد ثخانة باتجاه مركز الحوض، إذ تكثر فيها السحنة الغضارية، وتتعدى ثخانتها 500م، وذلك على حساب السحنة الرملية الكوارتزيتية؛ وتغيب في قاعدتها الصخور البازلتية. في حين تتناقص ثخانة التوضعات النيوجينية على أطراف الحوض إذ تزيد فيها التشكيلة الكونغلوميرانية العليا على 300م، وتكثر في بنيتها الكونغلوميرانية جلاميد صخرية كبيرة الحجم (ندور، 1985).

### منطقة القلمون

تتكشف على سفوح الجبال في الطرف الجنوبي الغربي من منطقة القلمون. توضعات النيوجين القارية. وقد دُرست هذه التوضعات في موقعين رئيسيين: موقع مجر القلمون - معلولا وموقع منين - عين الصاحب.

#### أ. النيوجين في منطقة مجر القلمون - معلولا

تنتشر توضعات النيوجين القاري على سفوح الجبال المحيطة بمجر القلمون. وقد دُرست هذه التوضعات في موقع على السفح الشمالي للجبل المشرف على بلدة معلولا.


#### مقطع معلولا - الحميرة

في شمال بلدة معلولا، وفوق الجدار الكلسي الضخم الذي يحمل اسمها، "جدار معلولا" (شكل 8)، الغني بأنواع مستحاثية من النموليتات المميزة للأوليغوسين (*Nummulites intermedius*)، تتكشف التوضعات النيوجينية، وذلك على النحو الآتي، من الأسفل إلى الأعلى (شكل 9):

- 1- طبقة حصوية رقيقة ذات ملاط غضاري، سيلتي. 0.50م
- 2- حجر رملي أبيض إلى أحمر اللون، ناعم الحبات، ضعيف التماسك. 5م
- 3- حجر رملي، غضاري، سيلتي. 7-5م
- 4- غضار رملي سيلتي ذو حصى صغيرة القد، تتخللها طبقات رقيقة من حجر كلسي ناعم التبلور. 25م
- 5- تناوب طبقات كلسية مع طبقات كونغلوميرانية، وطبقات غضارية رملية (3-10م)، وكلسية مارنية، إلى جصية، رقيقة إلى متوسطة الثخانة. 100-80م
- 6- طبقات كلسية متوسطة الثخانة. 30-20م
- 7- كونغلوميرا ذات عناصر متوسطة الحجم (5-15 سم). 70م



الشكل (8) توضعات النيوجين فوق جدار معلولا، وتبدو في المشهد السحنات المارتية الحطامية والكربوناتية.



الشكل (9) مقطع النيوجين شمال بلدة معلولا

تتميز في توضعات النيوجين القاري على الصعيد الليتولوجي في هذا الموقع تشكيلتان ليتولوجيتان:

آ - تشكيلة سفلى، مؤلفة قي قاعدتها من رمال كوارتزية، تتخللها بعض المستويات الكلسية والغضارية. في حين تغلب في القسم العلوي منها التوضعات المارنية الغنية أحياناً بسويات جصية، وتتناوب فيها طبقات كلسية رقيقة.

ب - تشكيلة عليا، مؤلفة بمعظمها من كونغوميرا كبيرة العناصر.

بيدي هذا المقطع تغيرات جانبية كبيرة، من حيث السحنة والشخانة. ويجري الانتقال فيه بين الطبقات بصورة متدرجة -في كثير من الأحيان-. وتشير التوضعات الكربوناتيّة والحطامية إلى الشرق من هذا الموقع (الحميرة) إلى القرب من مركز حوض الترسيب (شكل10).



الشكل (10) توضعات النيوجين الحطامية والكربوناتيّة إلى الشمال من بلدة معلولا

#### ب) النيوجين في منطقة منين

تنتشر توضعات النيوجين القاري بكثافة في منطقة منين الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة دمشق، حيث تستقر بلدة منين في حوض ضيق ذي اتجاه غرب - شرق، هو عبارة عن مقعر محصور بين جدر الإيوسين الأعلى والأوليغوسين الكلسية (شكل 11).




الشكل (11) بلدة منين في وسط الحوض النيوجيني بين جدر الإيوسين الأعلى والأوليغوسين الكلسية.

### مقطع عين الصاحب

يتسع هذا الحوض النيوجيني نحو الغرب، حيث تتراكم فيه توضعات حطامية شديدة الثخانة. وفي وادي عين الصاحب الواقع على مسافة 5 كم إلى الغرب من بلدة منين، رُفِع مقطع جيولوجي للتوضعات النيوجينية التي تستقر على سطح حتي من جدار الأوليغوسين الكلسي، عبر صخور بازلتية متفسخة، تبدو على النحو الآتي، من الأسفل نحو الأعلى (شكل 12):

- 1 - بازلت أوليفيني متفسخ على السطح الخارجي..... 15 - 20 م
- 2 - كونغوميرا متفككة ذات عناصر مختلفة الحجم من صخور بازلتية متناثرة في وسط لاثيريتي شديد التفسخ..... 10 - 15 م
- 3 - توضعات غضارية رملية تتخللها عدسات من كونغوميرا ذات عناصر كلسية متوسطة الحجم..... 50 - 70 م
- 4 - توضعات غضارية وغضارية-رملية..... 35 - 50 م
- 6 - كونغوميرا كتلية شديدة التماسك ذات ملاط كربوناتي..... < 50 م



الشكل (12) مقطع عين الصاحب إلى الغرب من بلدة منين

توضعات النيوجين في هذه المنطقة خالية على العموم من المستحاثات، باستثناء بعض معديات أرجل تدل على وسط بحيري- سبخي، إلا أنها ليست ذات قيمة كرونوستراتغرافية. حُلل عدد كبير من العينات دون العثور على أثر مستحاثي مميز يسمح بتأريخ هذه التوضعات القارية.



الشكل (12) مكرر - بازلت متفسخ في قاعدة التوضعات النيوجينية في منطقة عين الصاحب




## بالبيوجرافيا

يبين توزيع السحنات الليتولوجية لتوضعات النيوجين القاري في منطقة الدراسة أن الصخور البازلتية في قاعدة هذه التوضعات هي امتداد الصبات البركانية التي اندفعت من الجنوب، وقد غطت مساحات شاسعة من الأراضي (دوبرتريه، 1949-1966؛ بونيكاروف، 1966)، ولكنها لم تبلغ مع ذلك، الأطراف الشمالية للمنطقة.

تشير سحنات التشكيلة السفلى "تشكيلة عطا" المؤلفة من رمال كوارتزيتية ناعمة الحبات، حمراء اللون، إلى غياب التضاريس المحيطة بالمنطقة ومن ثم إلى هدوء المنطقة نسبياً من الناحية التكتونية. في حين أن ندرة هذه الرمال الكوارتزيتية تزداد تدريجياً باتجاه الجزء المركزي من المنطقة لتحل مكانها توضعات غضارية رملية.

أما التشكيلة العليا في التوضعات نيوجينية "تشكيلة التنايا" المؤلفة بمعظمها من كونغلواميرا ذات عناصر كبيرة الحجم أحياناً، فإنها تشير إلى تضاريس شديدة البروز بسبب حركات بنيوية لاحقة.

يشير التباين في ثخانة التشكيلات النيوجينية المختلفة في منطقة الدراسة إلى التباين في مراحل تشكل البنية الحوضية القارية بين الجبلية خلال تطورها البنيوي (شكل 13).



الشكل (13) بروفيل تقريبي دون مقياس يمثل تشكل حوض النيوجين القاري في منطقتي دمشق والقلمون.

(أ) سطح منطقة الدراسة في نهاية الباليوجين. (ب) بداية تشكل الحوض النيوجيني مع تقدم الصبات البركانية على أطرافه الجنوبية. (ج) الحوض النيوجيني الحالي

### تحديد عمر توضعات النيوجين القاري في المنطقة

نسب رازفالييف (1966-a) إلى القسم السفلي من التشكيلة الأولى (المستويات فوق الجسم البازلتية) عمر الميوسين الأسفل، في حين نسب إلى القسم العلوي منها عمر الميوسين الأوسط، وذلك مقارنة بتشكيلة مشابهة في حوض الدو، تحتوي على أنواع معينة من الأوستراكودا. غير أن هذه الأنواع ذات الانتشار المرتبط بالعوامل البيئية المتغيرة عادة، لا يكون وجودها مترامناً في الأماكن كلها بصورة عامة، إذ تسمح بتاريخ زمني دقيق.

وبالطريقة نفسها، نسب رازفالييف (1966-b) إلى التشكيلة الثانية (المستويات الكونغلوميرالية) عمر البليوسين التي تستمر حتى الرباعي.

حلل عدد من العينات من التوضعات الغضارية الطرية، بغية العثور على أشكال مستحاثية من الأوستراكودا أو من الطحالب، تفيد في تحديد عمر زمني دقيق لهذه التوضعات. إلا أنها كانت خالية من أي أثر عضوي ذي أهمية في هذا المجال.

في غياب المستحاثات المميزة، يصعب تحديد عمر دقيق لتوضعات النيوجين القاري بالاستناد إلى قرائن باليونتولوجية. وقد لجأنا في هذه الحالة، إلى نتائج التحليل النظائري الذي قام به معطي وآخرون (1992)، في بعض المواقع على الصخور البازلتية في قاعدة التشكيلة الرملية السفلى الذي تم الوصول بموجبه إلى تحديد عمر هذه الصخور بـ 20-20 مليون سنة، وهذا يشير إلى عمر الميوسين الأسفل. وهو العمر الذي نعتمده لهذه التشكيلة على هذا الأساس.

أمّا عمر التشكيلة الكونغلوميرالية العليا التي نسبت إلى البليوسين من قبل دوبرتريه (1949) وبونيكاروف (1967) وآخرون، فما زال بحاجة إلى تحديده بدقة.

### الاستنتاجات

يقودنا تحليل المعطيات التي تم الحصول عليها من الدراسة التفصيلية لتوضعات النيوجين القاري في منطقتي القلمون ودمشق إلى ما يأتي:

- تمييز تشكيلتين ليتولوجيتين في توضعات النيوجين القاري في منطقة الدراسة.
- مصادر العناصر الكونغلوميرالية هي صخور الباليوجين الكلسية. أمّا على سفوح السلاسل الجبلية الغربية (سلسلة جبال لبنان الشرقية، ومنطقة ميسلون)، فإن التوضعات الكونغلوميرالية تضم عناصر من الكريتاسي الأوسط، الأمر الذي يشير إلى حركات تكتونية عنيفة معاصرة.



- تدل نعومة الحبات في الوحدة الرملية على طاقة حركية كبيرة، أدى عامل النقل الريحي فيها دوراً مهماً. في حين تدل عناصر التوضعات الكونغلوميرانية مزوارة الرؤوس، على مسافة نقل قصيرة عن المصدر، وعلى طاقة حركية ضعيفة.
- حدوث مرحلتين من الحركات التكتونية: المرحلة الأولى، أيبيروجينية بصورة عامة، أدت إلى طفو شامل، رافقته عوامل حت واسعة على سطوح ضعيفة البروز مخلفة توضعات رملية ثخينة جداً، تداخلت فيها محلياً حافات الصبات البركانية المندفعة من الجنوب؛ والمرحلة الثانية، أوروجينية، سببت تشكل السلاسل الجبلية ذات التضاريس العالية التي كانت قممها مسرحاً لحت عنيف خلف توضعات كونغلوميرانية ثخينة.
- تشير الألوان الحمراء في التوضعات الرملية إلى مناخ حار وجاف في المنطقة خلال الميوسين، أسهم - إلى حد كبير - في أكسدة المحاليل الحديدية التي تحولت إلى ليمونيتية.

## المراجع REFERENCES

- Dubertret, L. 1949. Carte géologique au 1/50.000. Feuille de Zebdani. République syrienne, Ministère des Travaux Publics
- Dubertret L. 1966. Liban, Syrie et bordure des pays voisins. *Notes et Mem. Moyen-Orient*, 8, p. 251-358
- Faradzev V. A. 1966. Geological map of Syria, scale 1 : 200 000, sheet I-37-XIV. Explanatory notes. V. O. Teechnoexport, Moscow
- Kurbanov, N. and Zarjanov, Yu., 1966. Geological map of Syria, scale 1: 200 000, sheet I-37-XIV. Explanatory notes Teechnoexport, Moscow.
- Mouty, M., Delaloy, M., Fontignie, D., Piskin, O., and J. J. Wagner. 1992. The volcanic activity in Syria and Lebanon between Jurassic and Actual. *Schweitzerishche Mineralogische Petrographische Mitteilungen*, v.72, no. 1,
- Mouty, M., (in publication). New contribution to the tectonic study of the Palmyrides fold belt, *Damascus University Journal*.
- Ponikarov, V.P. 1967. Geological map of Syria. Scale 1/200 000 *Explanatory Notes*. Ministry of Industry, Syria
- Razvalyaev A. V., 1966. a- Geological map of Syria, scale 1: 200 000, sheet I-37-VIII. Explanatory notes. V. O. Teechnoexport, Moscow
- Razvalyaev A. V., 1966. b- Geological map of Syria, scale 1: 200 000, sheet I-37-VII, I-36-XII . Explanatory notes. V. O. Teechnoexport, Moscow
- سلوم ع. 1996. استراتيجيات النيوجين في سورية (تقرير داخلي). المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، دمشق.
- ندور م. 1985. النيوجين في منطقة دمشق. تقرير داخلي؛ المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، دمشق.