

الأعراض الاكتئابية لدى المراهقين

(دراسة مقارنة بين المراهقين المصابين بالسكري (النمط الأول)

والمراهقين غير المصابين به في مدينة دمشق)

إشراف الدكتورة

صباح السقا

إعداد طالبة الماجستير

سها فهد

كلية التربية

جامعة دمشق

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الفروق بين المراهقين المكتئبين المصابين بداء السكري (النمط الأول) مع أقرانهم المكتئبين غير المصابين بأي مرض مزمن من حيث شدة الأعراض الاكتئابية، بالإضافة إلى دراسة الفروق في شدة الاكتئاب لدى العينة المصابة بالسكري في ضوء متغيري الجنس والعمر.

وأجريت الدراسة على عينة قصديّة ضمن الفئة العمرية (13-18) سنة، وبلغ مجموع العينة (80) مراهقاً، (40) منهم مصاب بداء السكري، و(40) منهم غير مصاب بأي مرض مزمن.

ولقياس الأعراض الاكتئابية تمّ اختيار القائمة العربية لاكتئاب الأطفال، المقننة على البيئة السورية في عام (1999) من قبل عبد الخالق ورضوان، وقد تمتعت الأداة

بخصائص سيكومترية جيدة من حيث الصدق والثبات، وفي هذه الدراسة تمَّ قياس الخصائص السيكومترية للقائمة، وتبيَّن أنها تتمتع بصدق جيد وثبات عالي، حيث بلغ معامل (الثبات الداخلي) ألفا كرونباخ (0.909).

وكانت نتائج الدراسة كما يلي:

- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية (حقيقية) من حيث شدة الأعراض الاكتئابية، وذلك لصالح العينة المصابة بداء السكري.
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية (حقيقية) من حيث شدة الأعراض الاكتئابية لدى عينة المراهقين المصابين بالسكري وفق متغيّر الجنس، وذلك لصالح الإناث.
- 3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (حقيقية) من حيث شدة الأعراض الاكتئابية لدى عينة المراهقين المصابين بالسكري وفق متغيّر العمر.