رضوض الأوعية الدموية

Vascular Trauma

أ.د. هاشم محمد صقر

■ عبر التاريخ كان إنقاذ حياة المصابين بالرضوض النازفة يقوم على إيقاف النزف بطريقة (الضغط أو الدك أو الكي أو الربط).

■ عام ١٧٥٩م *William Hunter* قدم أول تقرير حول مفهوم الإصلاح الوعائي بهدف الحفاظ على حيوية الطرف : شرح فيه أنجاز *Hallowell* لأول إصلاح وعائي ناجح لشريان عضدي متمزق جزئياً، مستخدماً إبرة إصلاح احذية.

■ عام ١٧٦٢م *Lambert* رمّم ولأول مرة أوعية مصابة.

■ عام ١٨٩٧م *Morphy* قام بإعادة وصل شريان فخذي مقطوع بشكل تام .

● طريقة الأرقاء في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت ربط الأوعية.

● الجراحة الوعائية الترميمية بدأت في العقد

الخامس من القرن الماضي اثناء الحرب الكورية ، وتطورت بشكل كبير خلال الحرب الفيتنامية .

● من خلال دراسة علمية لتطور جراحة الأوعية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى حرب فيتنام لوحظ تناقص هام في معدلات البتور :

■ الحرب العالمية الأولى ٧٢,٥ %

■ الحرب العالمية الثانية ٣٥,٨ %

■ الحرب الكورية ١٣ %

■ حرب فيتنام ١٢,٧ %

● حتى بداية القرن الواحد والعشرين بقيت الاذيات الوعائية تشغل الحيز الاهم من العناية لدى مرضى الرضوض.

■ في عام ١٩٤٦ *Michael Ellis DeBakey* قدم دراسة علمية لمعالجة (٢٤٧١) أصابة شريانية لعناصر من الجيش الأمريكي تواجدوا في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ، جميعهم عولجوا بربط الشرايين النازفة عدا (٨١) حالة فقط عولجت بخياطة جانبية لجدر الشرايين .

■ تشكل أذيات الأوعية المحيطية الرضية ٨٠% من مجمل الأذيات الوعائية الرضية .

■ أغلب أذيات الأوعية المحيطية الرضية تتوضع في الأطراف السفلية .

■ فئة الشباب أكثر الفئات تعرضاً لهذه الأذيات .

Breakdown of United States Trauma

- الرضوض هي السبب الالهم للوفيات تحت عمر ٤٤ سنة .
- ٦٣% من الوفيات بعمر ١-٢٥ سنة كان سببها الرضوض، ٤٢% لدى الالعمار ٢٥ - ٤٤ سنة.
- الأذيات النالفة أو المخرقة هي السبب الالول للأصابات الوعائية (٦٠-٩٠%) غالباً بطلق نارى .
- الرضوض الكلىة نسبىا غير شائعة . غالباً بسبب حوالث السىر، الالصادام الحوالث الصناعىة والالذيات العظمىة .
- غالباً مالترافق الالذيات الوعائىة مع أذيات اعضاء مالعددة ، مع اضطراب بالعلامات الحىوىة.
- اذىة الالوعىة الكبرىة الجذعىة : الالبر الصدرى والبطنى والالوعىة الحررقىة غالباً مالكون مهددة للحىاة، بىنما اذىات الالوعىة الالطراف غالباً مالتهدد حىوىة الطرف . الالققىم والالالخال فى هذة الحالال الالجب ان يكون سرىعاً وانقالذياً .
- غالباً مالترافق اصابات الالوعىة مع اصابات الجهاز الهىكلى أو الالاعضاء المبالورة ، لذا الالجب اسالقصاءها بشكل جىد الالجنباً للالذيات الخفىة .

الفيزيولوجيا المرضية لأذيات الأوعية المحيطية *pathophysiology of limb vascular injury*

تتظاهر الأذيات الوعائية المحيطية الرضية بعرضين أساسيين :

A. النزف : يكون غزيراً في التمزقات الشريانية (زيادة فتحة التمزق الثانوي بسبب التقبض الانعكاسي للعضلات الملساء الهادف الى اغلاق الشريان) . وهو نوعان :

١. خارجي : ظاهر للعيان .

٢. داخلي : مستتر وخطير حيث يشكل ورم دموي نابض ، ينتج عن تسرب كمية من الدم الشرياني ضمن النسيج الحية المغلقة وقد يؤدي لتخريب العناصر الهيكلية (أعصاب وعضلات ...) بالية الضغط ، وقد يسبب :

- ناسور شرياني وريدي في حال ترافق مع تمزق الأوردة المجاورة .
- أم دم كاذبة تتطور مع مرور الوقت .

يعتبر النزف قاتلاً في الحالات التالية :

- نزف ٤,٥-٥% من كتلة الجسم .
- نزف ٤٠-٥٠% من حجم الدم .
- ان نزف ١,٥-٢ ليتر يسبب الوفاة عند ٣٣% من المصابين
- ونزف أكثر من ٢ ليتر يسبب الوفاة عند ٨٣% من المصابين
- عوامل خطورة النزف هي :
 - كمية النزف
 - سرعة النزف
 - مكان النزف

B. الإقفار: يحدث نتيجة نقص التروية الحاد ، حيث يبدأ الاستقلاب اللاهوائي لتأمين حاجة الطرف من الطاقة ،ينتج عن ذلك طرح كميات كبيرة من حمض اللبن وقواعد آزوتية بيورينية وفضلات استقلابية أخرى .

إن عدم إعادة التروية واستمرار الإقفار يؤدي الى:

١. موات لاعكوس .
٢. إنتان خطير يفرض إجراء بتر رئيسي .
٣. يسبب اجتماع (١ + ٢) قصور كلوي حاد يهدد حياة المريض .

- **الأعصاب المحيطية** تعتبر أكثر الأنسجة حساسية للإقفار فقد تحدث الأذية العصبية بعد فترة قصيرة من الإقفار:
- **الأعصاب الحسية** أكثر حساسية للإقفار من الأعصاب الحركية، حيث يتحمل العصب الشظوي فترة إقفار لا تتجاوز (٣٠ دقيقة).
- **العضلات الهيكلية** تتحمل فترة إقفار (٦ - ٨ ساعات).

حجم الأذية الإقفارية يعتمد على:

A. مدة الإقفار.

B. حجم الكتلة المقفّرة.

C. كفاية الدوران الجانبي.

D. المستوى التشريحي للإصابة.

E. السوابق المرضية للجذلة الوعائية.

مرحلة عودة التروية :

● عودة التروية الدموية للطرف بعد إصلاح وعائي ناجح (إن تم) تؤدي إلى تحرر فضلات استقلابية ناتجة عن استقلاب لاهوائي أثناء فترة الإقفار، يظهر ذلك في :

■ ارتفاع بوتاسيوم الدم.

■ ارتفاع الميوغلوبولين.

■ حدوث حمض أستقلابي والذي يؤدي إلى :

✓ قصور كلوي

✓ قصور تنفسي

✓ اضطراب نظم القلب.

● عودة التروية يؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من **الأوكسجين** وبالتالي تحرر **جذور الأوكسجين الحرة** والتي تلعب دوراً رئيسياً في حدوث **الأذية الإقفارية** ، حيث التركيبية الإلكترونية لهذه الجزيئات غير مستقرة لذا تتفاعل مع جزيئات أخرى لتستقر مثل **جزيئات الفوسفوليبيد** المتواجدة في غشاء الخلايا البطانية « **تفكك وانحلال هذا الغشاء**» ارتفاع نفوذية الأوعية الشعرية « **الوذمة** ، والتي ترفع الضغط ضمن الحجرات .

- يحدث انسداد الأوردة عندما يصبح الضغط ضمن الحجرات < الضغط ضمن الوريدات ما بعد الأوعية الشعرية.
- يتوقف الجريان الدموي الشعري ويحصل إقفار بعودة التروية عندما يقارب الضغط ضمن الحجرات (٢٠ - ٤٠ ملم ز) والذي يسبب انضغاط الشعيرات الدموية (٢٥ - ٣٥ ملم ز) .

أكثر الشرايين تعرضاً للانضغاط والانسداد عند ارتفاع الضغط ضمن الحجرات هي الشرايين المغذية للعضلات = جس النبض المحيطي لا ينفي حدوث تناذر الحجرات .

• تصنيف الجروح:

١. الرضوض او ما يعرف بالاصابات الرضية (lacerated injuries) وتشمل:

A. السحجات (abrasions)

B. الكدمات (bruises or ecchymosis)

C. الجروح الرضية (lacerated injuries)

٢. الجروح الحادة (sharp wounds) وتشمل:

A. الجروح القطعية (cut wounds)

B. الجروح الطعنية (stab wounds)

٣. الجروح الوخزية (puncture wounds)

٤. جروح الآلات ذات الصفات الخاصة كتلك التي تجمع بين الصفة القاطعة والراضة وتسمى الآلات

الراضة القاطعة مثل الفأس والساطور وفيها طرف حاد يعمل كألة حادة اضافة الى ثقلها والقوة المستعملة للضرب بها والتي تعمل بمثابة آلة راضة مما يؤدي الى جروح تجمع بين الصفتين وتسمى الجروح (الرضية القطعية).

٥. جروح الاسلحة النارية بجميع انواعها.

٦. الاصابات الاخرى مثل الحروق وغيرها.

تصنيف الأذيات الوعائية :

ان معرفة العوامل المسببة للأذية الوعائية وأدواتها وطبيعتها ومصدرها وآلياتها تحدد طريقة العلاج والتدبير الجراحي المناسب.

أ. حسب آلية الراض : *Mechanisms of injury*

A. أذيات ثاقبة : *Penetrating trauma* .

B. أذيات كليلة : *Blunt trauma* .

C. أذيات طبية المنشأ : *Iatrogenic trauma* .

D. أذيات التشعيع : *Irradiation trauma* .

.II. حسب مصدر الإصابة:

A. رضوض الأوعية من الداخل إلى الخارج :

هي الأقل تواتراً والسبب الأشيع لهذه الآلية هو الرضوض الطبية (قناطر "شريانية ، وريدية ، فوغارتي" ، سلك دليل ، بالون توسيع ...) الأذية يمكن ان تشمل فقط البطانة وقد تمتد إلى المتوسطة أو تسبب انثقاب جدار الوعاء.

B. رضوض الأوعية من الخارج إلى الداخل :

تحدث نتيجة رض من خارج الجسم بأدوات حادة - ثاقبة - واخزة أو كليلية، مما يؤدي إلى إصابة طبقة أو أكثر من جدار الوعاء.

III. حسب التشريح المرضي A. أذية البطانة.

(A), tunica intima (B), internal elastic lamina (C), tunica media (D), external elastic lamina (E), tunica externa

من الناحية النسيجية تكون فقط البطانة متأذية والطبقة المحددة المرنة الباطنية سليمة، وتختلف شدة الإصابة حسب :

o مساحة الإصابة وقطر الوعاء المصاب:

عند حصول إصابة كبيرة في شريان صغير يؤدي ذلك لخطورة انسداد عالية ، أما في حال حصول إصابة صغيرة في شريان كبير فقد تمر دون أي خطر يذكر.

o الشكل التشريحي للإصابة:

الإصابة الطولية الموازية لمحور الشريان قد تمر دون خطورة، أما الإصابة العرضانية أو بشكل حلقي (على كامل محيط الوعاء) قد تؤدي إلى تخثر وانسداد شرياني .

(A), tunica intima (endothelium) (B), tunica media (C), tunica externa.

Artery Wall

B. أذية البطانة والطبقة المتوسطة.

في هذه الحالة تصل الإصابة إلى الألياف العضلية للطبقة المتوسطة متجاوزة البطانة والطبقة المحددة المرنة الباطنية مما قد يؤدي لانسلاخ في الطبقة المتوسطة.

المظهر العياني : عبارة عن ورم دموي أو خثرة ضمن جدار الوعاء .

C. أذية الطبقات الثلاث:

- تكون الإصابة على شكل جرح ذو حواف منتظمة أو غير منتظمة تنتج عن تهتك وتخرّب كامل طبقات الجدار.
- جرح جدار الوعاء قد يكون جزئي أو كامل (قطع تام). يؤدي ذلك لخروج الدم من السرير الوعائي (نزف).

الأذيات الثاقبة: تتضمن الأذيات التالية:

رضوض الأوعية بالطلق الناري :

◆ تشكل ٧٠% من مجمل الإصابات الرضية المحيطية .

◆ تنجم عن الإصابة بمقذوف بسرعة عالية < ١٠٠٠ م / ثانية ، وتحدث بالأليات التالية:

١. آلية ارتطام الطلق الناري بالحزمة الوعائية بشكل مباشر والذي يسبب تهتك شديد وضياع مادي كبير فيها = جوف دائم : وهو خط سير المقذوف ويتعلق بنوعه وشكله.

٢. آلية عبور الطلق الناري حول خط سير المقذوف بالقرب من مسار الأوعية الدموية والناجمة عن الطاقة المحمولة بهذا المقذوف والتي تتبعثر طاقتها بتزوي قائم بالنسبة لمسيرها ، ينتج عن ذلك تجويف مؤقت < 40 ضعف من حجم المقطع المعترض للرصاصة نفسها وهذه الطاقة ، ضخمة مبعثرة تتجاوز قوتها مرونة جميع الأنسجة التي تعبرها بما فيها الأوعية ، مخلقة أذية حرارية وبالتالي تهتك جدرانها.

٣. آلية ارتطام طلق ناري أو شظية عالية السرعة ناجمة عن انفجار ألغام أو قنابل بنسيج عظمي ، يسبب تشظيه إلى شظايا صغيرة ذات سرعات عالية ، تسبب بدورها أذية في العناصر التشريحية المجاورة ومنها الحزمة الوعائية.

Arab7.com

أنماط الأذية الوعائية:

I. تمزق البطانة ← سديلة بطانية.

II. تكدم ونزف ضمن جدار الشريان ←

تضيق اللمعة ← تشكل خثار ضمن

منطقة التضيق ←

A. توقف الجريان (نقص تروية). أو

B. تشكل أم دم حقيقية ثانوية بسبب تهتك كامل طبقات الشريان .

III. تمزق جدار الشريان جزئي أو كلي .

IV. تشنج شرياني: ارتكاس العضلات الملساء

اتجاه الرض ← تضيق قسمي .

يعتمد حجم الأذية المحدثة على:

A. حجم وشكل الطلق الناري.

B. المسافة المقطوعة قبل الارتطام.

C. الطاقة الكامنة بالطلق الناري.

D. مكان الإصابة.

الجروح الطاعنة:

تشكل ٥ - ١٠% من مجمل الأذيات
الرضية المحيطية.

تحدث نتيجة طعن بألة حادة كالسكين أو
الزجاج المكسور أو قنابل وألغام منفجرة.

■ خدش *Abrasion*

■ تمزق أو تهتك *Laceration*

■ قلع أو قطع *Avulsion*

■ شق *Incision*

■ ثقب *Puncture*

■ بتر *Amputation*

Laceration

Puncture wound

- يحدث انقطاع جزئي أو كامل في جدار الوعاء.
- إنذار الجروح الطاعنة البسيطة جيد بسبب:
 - A. الجروح نظيفة غالباً.
 - B. حواف الجروح الوعائية منتظمة.
 - C. النسيج المجاورة سليمة.

الأذيات الكليّة:

ينتج عنها معدل بتورعالي ٢٠ - ٧٩% بسبب :
A. إصابة كافة العناصر التشريحية (أوعية ، أعصاب
عضلات وعظام ...) .
B. مساحة إصابة واسعة .
تتضمن الأذيات التالية:

- حوادث السير .
- حوادث السقوط .
- الأذيات الهرسية: تحدث عادة في الأطراف حيث
الأوعية الدموية سطحية ينتج عنها غالباً إصابة
البطانة أو البطانة والمتوسطة .

● أذيات السحب *Tract's injury* :

غالباً تحدث في خلوع المفاصل وخاصة مفصل الركبة .

● خلع مفصل الركبة الخلفي: أكثر الخلوع

التي تترافق مع أذية وعائية، بسبب تعرض بطانة الوعاء لقوة شد كبيرة ← تمزق جزئي ← سديلة بطانية أو انقطاع تام عند استمرار قوة الشد.

● غالباً تترد خلوع مفصل الركبة قبل وصول المصاب إلى المشفى لذا فقد تزول الأذية الوعائية المحدثه، حيث تظهر أعراضها بعد الإصابة مباشرة، وقد لا تتناسب الأعراض مع شدة الإصابة.

Neurovascular Injury in Supracondylar Fracture of Humerus

Supracondylar fracture of humerus with entrapment of brachial artery and median nerve may result in Volkmann's contracture

- قد يحدث تمزق جزئي أو كامل في جدار وعاء دموي نتيجة قوة القطع المحدثه بتزوي عنيف ومفاجئ لعظم مكسور خاصة العظام الطويلة، كما في كسر عظم العضد فوق اللقمتين أو كسور القسم البعيد من عظم الفخذ أو كسور عظم الظنوب.

الأذية العظمية

كسر فوق اللقمتين بعظم العضد

خلوع مفصل الكتف

خلوع مفصل المرفق

كسور عظم الفخذ في الثلث السفلي

خلوع مفصل الركبة الخلفية

كسور عظم الظنوب في الثلث العلوي

الأذية الوعائية المرافقة

الشريان العضدي

الشريان الإبطي

الشريان العضدي

الشريان الفخذي السطحي / المأبضي

الشريان المأبضي

الشريان المأبضي / شرايين الساق

الإصابات المرافقة للأذية الشريانية

- إصابة أعضاء حيوية.
- إصابة عصبية.
- إصابة عظمية.
- إصابة عضلية وجلدية.

■ إصابة وريدية :

- توجد عند ٤٥ % من المصابين برضوض شريانية.
- تظهر أحياناً بعد إجراء الإصلاح الشرياني.
- يجب إصلاح الإصابة الوريدية (سطحية أو عميقة) ، خاصة في الإصابات الكبيرة وبتور الأطراف.

النتائج التشريحية للرضوض الشريانية :

تتعلق بنوع النسيج وحجم الشريان المصاب وهي:

I. نتائج مبكرة : تتظاهر على شكل:

A. تشنج شرياني: ينتج عن إصابة الشرايين العضلية والصغيرة.

B. ورم دموي مسلخ يؤدي الى انسدادات شريانية بسبب إصابة البطانة أو البطانة والمتوسطة.

II. نتائج متأخرة:

تضييق شرياني ينتج عن ألتئام البطانة والطبقة المتوسطة المصابة نتيجة :

A. فرط تصنع الألياف العضلية الملساء.

تسمك جدار الشريان نحو لمعته.

B. فرط تصنع في الخلايا البطانية.

B. النواسير الشريانية الوريدية:

- تنتج عن رض قاطع أو واخز لجدار شريان ووريد مرافق.
- فترة ظهوره من (٢-١٦) ساعة وحتى ٨ أيام وأحياناً عدة سنوات.
- تترافق النواسير مع أمهات دم كاذبة في ٦٠% من الحالات.

المعايير الأساسية في تدبير الرضوض:

١. تبدأ العناية الفعالة بالمصاب من مكان الإصابة ولا تنتهي إلا حينما يغادر مركز إعادة التأهيل.

٢. تشمل العناية الفعالة بالمصاب جهود فريق من مختلف الاختصاصات (تقييم بدئي ، وضع مخطط أولي).

٣. السرعة والدقة في تحديد كافة الأذيات وكذلك العوامل المرضية التي يمكن إهمالها مؤقتاً.

٤. السرعة والدقة بتطبيق المداخلات المناسبة والموجهة حسب أهميتها وخطورتها (الأخطار المهددة للحياة أولاً).

تدابير ضرورية في الاصابات الرضية

يجب القيام مباشرةً وبشكل متزامن وليس بالتتابع بالخطوات التالية :

■ **C-A-B** - أنعاش قلبي - رئوي :

الدورة الدموية ، مجرى الهواء ، التنفس

Circulation- Airway-Breathing

■ إيقاف النزف أو التقليل منه قدر المستطاع (ضغط إصبعي أو رباط مطاطي ضاغط).

■ معالجة الصدمة النزفية - بتعويض نقص الحجم.

■ الوقاية من الإنتان (تقنية عقيمة، صادات ..).

■ علاج تناذر إعادة التروية في الأطراف والأعضاء المقفرة وإصلاح الحمض الإستقلابي.

التشخيص والعلاج :

● **قصة مرضية وفحص فيزيائي:** يجب أخذ قصة المرض وآيته بشكل سريع ومفصل من المصاب نفسه إن كان يستطيع أو من مسعفيه لمعرفة التالي :

١. طبيعة الأذية الوعائية.

٢. مقدار الدم المفقود ومصدره .

٣. أعراض الإصابة الدورانية أو الحسية أو الحركية طول فترة الإقفار.

٤. قصة DVT سابقة.

٥. وجود قصة لأصابة وعائية سابقة رضية أو غير رضية في نفس الطرف.
مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال الإصابة الوعائية في الحالات التالية :

A. وجود جرح قريب من مسار شريان .

B. وجود رض مغلق مع إصابة عظمية بالقرب من مسار شريان .

C. كسر النهاية السفلية للعضد.

D. كسر النهاية السفلية للفخذ.

E. خلع الركبة الخلفي أو كسر عظم الظنوب وتبدله إلى الخلف.

علامات كبرى (التشخيصية) للإذية شريانية :

A. نرف نابض أو فعال .

B. ورم دموي (هيماتوم) متمدد أو نابض.

C. غياب النبض المحيطي أو أقفار الطرف .

علامات نقص تروية حاد. (الباءات الخمسة 5P's)

pain, pallor (becomes blue/purple if severe ischaemia), pulselessness, parathesia & paralysis (in extreme cases).

(ألم - شحوب - غياب نبض - شلل حسي و شلل حركي).

D. نفخات أو هرير تدل على ناسور شرياني وريدي.

❖ وجود نبض محيطي لا ينفي دائماً الإصابة الوعائية: فقد لوحظ بقاء نبض محيطي مجسوس مع وجود إصابات وعائية محيطية هامة ،،، ٢٥% منها احتاج لإصلاح وعائي .

❖ في اذيات الاوعية الكبيرة ،داخل جوف البطن والصدر ،تقل اهمية النزف كعلامة كبرى ويصبح هبوط الضغط اهم واكثر فعالية في المراقبة ،يحدث لدى ٢٥% من اذيات الاوعية داخل البطن والصدر ،مع نسبة وفيات عالية ٨٦% .

علامات صغرى أو غير مؤكدة للاذية الشريانية :

A. هيماتوم غير نابض .

B. نبض ضعيف .

C. فقر دم غير مفسر .

D. هبوط ضغط .

E. اذيات مجاورة (عصب غالباً).

احيانا قد تكون الاذية الوعائية خفية دون علامات صغرى او كبرى ،تكشف لاحقا بلاستقصاءات الشعاعية.

أذية وعائية ثابتة أو كلية

تتظاهر سريرياً بنزف فعال أو ورم دموي نابض أو متمدد أو إقفار في الطرف

نعم

تدخل جراحي فوري

علامات خطورة عالية لوجود أذية وعائية
 $1.0 > ABI$ و اختفاء النبض المحيطي أو
وجود أذية عصبية واضحة أو أذية بطلق ناري
مجاور تشريحياً للحزمة الوعائية

تصوير شرياني ظليل

طبيعي

مراقبة

أذية وعائية بسيطة

مراقبة مع إمكانية إعادة الـ DSA
في حال تدهور حيوية الطرف

أذية وعائية صريحة

التدخل الجراحي

علامات خطورة منخفضة لوجود أذية وعائية
 $1.0 \leq ABI$ مع واحد أو أكثر من العلامات غير
الصريحة. النبض المحيطي مجسوس لكنه ضعيف

الفحص السريري: التأمل وجس الشرايين قد يكون كافي لوضع تشخيص البدئي ، لكن لتأكيد التشخيص واختيار طريقة العلاج قد نحتاج إلى إجراء أحد أو بعض الاستقصاءات كفحوص تكميلية وهي :

١.الدوبلر.

٢.الايكو دوبلر.

٣.التصوير الشرياني الظليل *DSA*

٤.التصوير الطبقي المحوري.

٥.المرنان الوعائي *MRI*.

Normal ABI > 1.0
Abnormal < 0.90

عوامل خطورة الاصابة الرضية الوعائية :

© 2004 Institute for Justice and Democracy in Haiti

I. طبيعة الرض وشدته (الانذار سيء في إصابات السقوط وحوادث السير والطلق الناري) .

II. كمية الطاقة الحركية المتضمنة في آلية الرض .

III. موقع الإصابة يحدد الإنذار:

- مهدد للحياة (إصابات الدماغ ، الصدر والبطن) أو
- مهدد للوظيفة إصابات الأطراف.

I. الفترة الزمنية قبل العلاج يجب أن لا تتجاوز دقائق في إصابات الأوعية الكبيرة. ولا تزيد عن 6 - 8 ساعات في الأوعية الأصغر حيث يبدأ الموت الخلوي .

تقنيات خاصة في تدبير رضوض الأوعية

Compartment Syndrome of Forearm and Hand

Incisions

١. ضرورة تثبيت الكسور المرافقة .
٢. تسليخ الأوعية دون أذية الفروع الجانبي.
٣. تنضير حواف الأوعية، تحضيراً للخياطة الوعائية، والتي يجب أن تتم على نسج سليمة دون شد أو توتير.

٤. إزالة الخثرات ضمن اللمعة مع غسيل جيد بسائل فيزيولوجي مهبّرن .

٥. ضرورة تغطية المفاغرات والمجازات بالأنسجة المحيطة (عدم تغطيتها بالجلد فقط) .

٦. إصلاح الإصابات الشريانية قبل الوريدية.

٧. ضرورة خزع الصفاق للأطراف المتوذمة بعد الرض أو بعد إعادة التروية أو في الإصابات الوريدية الشديدة ،لتجنب حدوث متلازمة الحجرات بعد إعادة التروية.

Incisions for Compartment Syndromes of Leg

أشكال الإصلاح الشرياني:

■ الربط الشرياني : عندما تكون منطقة التهتك كبيراً وغير قابل للإصلاح .

SUBCLAVIAN	20%
AXILLARY	25%
BRACHIAL(above profunda)	50%
BRACHIAL	25%
RADIAL	2%
ULNAR	1%
AORTA	99%
COMMON ILIAC	75%
EXTERNAL ILIAC	30%
COMMON FEMORAL	50%
SUPERFICIAL FEMORAL	30%
POPLITEAL	50%
ANTERIOR TIBIAL	5%
POSTERIOR TIBIAL	5%

- خياطة جانبية: مباشرة أو مع وضع رقعة .
- خياطة : نهاية - نهاية (إعادة وصل مع أو بدون وصلة)

- مجازة بوضعية تشریحية
- مجازة بوضعية خارج تشریحية

● طريقة حديثة لمعالجة الرضوض:

١. وصلة صناعية على دعامة معدنية توضع داخل

لمعة الشريان *Endovascular Stent Graft*

لمعالجة أمهات الدم الرضية الكاذبة أو الناسور

الشرياني الوريدي .

٢. التصميم : Embolotherapy

Figure 4A. Post traumatic leakage from left hepatic artery causing hemobilia, dye discharging into duodenum via common bile duct.

Figure 4B. Pre (left) and post (right) embolotherapy with absorbable gelatin stopped the leakage immediately.

رضوض أوعية الصدر والبطن

Abdominal and Thoracic Vascular Trauma

رضوض الأوعية الصدرية : تشمل

١. أذيات الأبهر الصدري وفروعه .
٢. أذيات الشريانين الرئويين وأوردتهما.
٣. أذيات الأجوف العلوي والأجوف السفلي .
٤. أذيات الأوعية الوريدية وشرابين الثدي الباطنة.

تشكل ٩ % من مجمل الرضوض ، وهي خطيرة ومهددة للحياة فقد يحمل الشخص الذي تعرض لمثل هذا النوع من الرضوض ، أذيات قاتلة دون أن يبدي أي علامات أو أعراض في بادئ الأمر .

القوى المسؤولة عن تمزق الأبهر:

- تتظاهر القوة الرضية سريراً بوضوح عند تمزق البطانة ، وتستمر باتجاه الغلالة التي تبقى سليمة بسبب قوة مغرائها .

- يؤدي ارتفاع ضغط اللمعة المفاجئ لانفجار الأبهر ، ويتراوح هذا الضغط بين (٥٨٠ - ٢٥٠٠) ملم زئبق .
تشمل هذه القوى كلاً مما يلي :

✓ وقف التسارع العامودي (السقوط) .

✓ وقف التسارع الأفقي مع أو دون انضغاط الصدر .

✓ الانضغاط التالي للتصادم المباشر من الأمام .

✓ أذيات الهرس .

مناطق الاصابة :

A. منطقة برزخ الأبهر.

B. منطقة دخول الأبهر الصدري إلى البطن .

تمثل نقاط ثبات نسيجي مما يجعل طاقة التسارع

أعظمية فيهما.

• أماكن الرض تسبب أمهات دم كاذبة نتيجة تسرب

الدم خارج الوعاء .

• أمهات الدم قد تكون صغيرة ، أو كبيرة ذات خطورة

تمزق عالية.

التشخيص : يعتمد على القصة المرضية ، الية الرض ، الفحص السريري
والفحوص المتممة .

الأعراض السريرية والعلامات:

- ١ . ألم خلف القص أو بين الكتفين (بسبب تسلخ غلالة الأبهـر أو تمططها) .
- ٢ . الزلة التنفسية .
- ٣ . فقدان الوعي والسبات .
- ٤ . هبوط الضغط الدموي .
- ٥ . فرق الضغط بين الاطراف العلوية والأطراف السفلية .
- ٦ . كسور الأضلاع العديد أو كسور عظم القص .
- ٧ . سماع نفخة انقباضية بين الكتفين أو أمام القلب .
- ٨ . تدمي الصدر Haemothorax ، وزيادة عرض المنصف على صورة الصدر .

الوسائل المساعدة بالتشخيص:

- صورة الصدر
- CT الصدر والبطن مع الحقن
- ايكو القلب عبر المري TEE
- MRI
- تصوير الشرايين الظليل

التدبير:

١. الإنعاش القلبي الرئوي السريع .
٢. تدبير صدمة نقص الحجم بسبب النزف .
٣. فتح الصدر الإسعافي.
٤. تجهيز التحويلات الوعائية ودارة القلب الاصطناعية .
٥. تجهيز الأدوات الجراحية اللازمة والطعوم الصناعية .

ثانياً : رضوض الأوعية البطنية :

● وتقسم حسب آلية الرض الى :

■ الرضوض النافذة بالأدوات الحادة.

■ الرضوض النافذة بالأسلحة النارية .

■ الرضوض الكليلة (أقل شيوعاً) بآلية

فقد التسارع أو الانضغاط الشديد.

● تسبب جميعها النزف ضمن البطن .

التشخيص :

● سريراً :

- ١ . هبوط الضغط والصدمة بنقص الحجم وصعوبة رفع الضغط أثناء تعويض نقص الحجم .
- ٢ . انتفاخ البطن والدفاع والألم الشديد الناجم من تخريش البرتوان الجداري .
- ٣ . ضعف النبض في الطرفين السفليين أو غيابها.
- ٤ . تدمي البول .
- ٥ . النزف الهضمي السفلي .

وسائل مساعدة :

١. أيكو و CT مع الحقن للبطن والحوض.

٢. تصوير ظليل للجهاز البولي .

٣. إجراء الغسالة البطنية التشخيصية DPL.

٤. تصوير ظليل للشرابين .

٥. تنظير البطن الإسعافي.

التدبير :

حسب المنطقة من الأبهـر المتوقع اصابتها ، يتم اختيار الشق الجراحي المناسب (الأبهـر فوق الجزع الزلاقي – الأبهـر فوق الكليتين – الأبهـر تحت الكلوي) .

رضوض الأوعية العضدية الرأسية
Brachio-Cephalic Trauma

رضوض الشريان السباتي : Carotid Artery Trauma

- معظم الرضوض تنجم عن الأذيات النافذة وخاصة بالجهة اليسرى أما الرضوض الكليلة فنادرة .

- وتنقسم الإصابات إلى ثلاث مجموعات :

.A أذية السباتي المشترك والباطن دون أذيات عصبية وهي الأشيع.

.B أذية السباتي المشترك والباطن مع أذيات عصبية ضعيفة .

.C أذية السباتي المشترك والباطن مع أذيات عصبية شديدة.

العلامات والتشخيص:

يؤكد التشخيص بالتصوير الظليل للشرابين إذا كان وضع المريض يسمح بذلك ويتظاهر رض السباتي الكليل على شكل:

A. تناذر هورنر (هبوط جفن - توسع حدقة - جفاف الوجنة).

B. نوبات نقص تروية دماغية وفترات صحو بعد الرض.

C. خزل الطرف عند المريض الصاحي .

D. أذية السباتي بالتمطيط في فرط بسط الرقبة وذلك في نقطة دخول الباطن الى قاعدة القحف .

الأذيات النافذة تتظاهر ب:

A. النزف الغزير .

B. سكتات دماغية حادة أو السبات أحياناً .

معدل الوفاة في مثل هذه الحالات يبلغ أكثر من ٤٠ % .

التدبير:

- خياطة مباشرة.
- وضع وصلة وريدية أو وصلة صناعية.
- ربط السباتي في الاصابات الشديدة والواسعة واستحالة الترميم الوعائي. ونسبة حدوث السكتة الدماغية عند ذلك تفوق ٥٠ %.
- تدبير النواسير الشريانية الوريدية في حال حدوثها .

رضوض الشرايين الفقارية : *Vertebral Artery Trauma*

تتصف بما يلي

- A. نادرة الحدوث لوحدها. بسبب توضع الشريان الفقري ضمن القناة العظمية من الفقرة الرقبية السادسة وحتى الثانية.
- B. نازفة بشدة لصعوبة الوصول اليها .
- C. غالباً تشخص الإصابة بتصوير الشرايين الظليل .

التدبير : وتتم بعدة طرق :

١. الربط أو دك منطقة الاصابة – أو أخذ قطبة غارزة.
٢. ترميم الإصابة بالتقنيات الوعائية المختلفة .
٣. تبلغ وفيات رضوض الشريان الفقاري ١١%-٢٥% منها ٥% تنجم عن أذية الشريان الفقري بالذات بينما غالبية الحالات تنجم عن الأذيات العصبية المركزية المرافقة ،وعن النزف الشديد، وتوقف القلب.

الأذيات الوعائية في مخرج الصدر: Thoracic Outlet Vessel Injuries

تحمل أعلى نسبة وفيات من بين الرضوض الوعائية بسبب نزفها
الغزير ضمن الصدر وخارجه .

الأسباب :

١. المرامي النارية .
٢. السقوط .
٣. طعنات السكاكين .
٤. رضوض فقد التسارع .
٥. رضوض كليلة .
٦. رضوض مقود السيارة .

التشخيص :

١. النزف .
٢. الورم الدموي الكبير أو الممتد في جذر العنق .
٣. اتساع المنصف العلوي < ٨ سم .
٤. نزف مستمر بالصدر أو تدمي الصدر الشديد .
٥. هبوط الضغط المعند .
٦. إصابات عصبية متنوعة (ضفيرة عضدية –عصب حجابي – حبل شوكي).

التدبير:

النقطة الجوهرية هي السرعة وعدم التردد والتأخر بالتداخل الجراحي ، وعند الضرورة التداخل السريع بفتح القص الناصف غالباً، ويتراوح التداخل بين الخياطة البسيطة أو وضع رقعة أو وضع الطعوم الصناعية.
(أذيات الأوردة الكبيرة خطيرة جداً تصعب السيطرة عليها)

أذيات أوعية الأطراف *Extremity Vascular Trauma*

- لا تهدد الحياة لكنها قد تهدد الطرف بالعجز أو البتر .
- أنواع الرضوض ومسبباتها :
 - الجروح النافذة بسبب الطلق الناري.
 - الجروح النافذة بسبب الأدوات الحادة : (تبدل الكسور الشديد – الشظايا العظمية – خلع الركبة).
 - الرضوض الكليلة .

● علامات مباشرة للإصابة الشريانية :

- نقص التروية المحيطة – الاقفار (ضعف النبض أو غيابه) .
- الورم الدموي النابض أو الذي يزداد حجمه بسرعة .
- النزف الشرياني .

● العلامات غير المباشرة :

- الورم الدموي الصغير أو المتوسط الحجم .
 - الصدمة غير المفسرة .
 - أذية العصب المجاور .
 - قرب الجرح النازف من مسار وعاء كبير .
- تصوير الشرايين الظليل هو الطريقة الأكثر دقة في كشف الإصابة الشريانية .

مبادئ التداخل الجراحي:

- A.** استطباب البتر البدائي : يعتبر قراراً شديداً الصعوبة وحرصاً يشترك في اتخاذه جراح الأوعية مع جراح العظمية و العصبية .
- B.** يجب حقن الشجرة الشريانية المحيطة بمحلول رينغر المهبرن/ ١٠٠٠ وحدة هيبارين، والحاوي على المانيتول .
- C.** قد تستعمل التحويلة المؤقتة إذا كان النزف ضعيفاً أو عند وصول الطرف لإقفار شديد .
- D.** أحيانا يرمم الوريد قبل الشريان إذا كان كبيراً أو كونه الطريق الوحيد للعود الوريدي .
- E.** هناك خلاف حول الحاجة الى تثبيت الكسور قبل الترميم الشرياني أو بعده لكن يفضل التثبيت أولاً بشرط أن لا يؤخر ذلك الترميم الوعائي .