طرق دراسة خلايا الدم، نقي العظم والعقد اللمفاوية

ا.د.تهاني علي

تعداد الدم HEMOGRAMME

- فحص كمي او تعداد دموي

- فحص كيفي:

دراسة شكلية لمختلف مكونات الدم تشمل صيغة البيض والبحث عن شذوذات شكلية.

مبدأ تعداد الدم

- يقدر التعداد مستوى الخلايا الدموية المختلفة في حجم محدد من الدم
- حسب النظام العالمي للوحدة (SI) : اتعبير عن الحجم بليتر من الدم
- في الممارسة مازال يستعمل التعداد في ملم³ دم
- تعداد الدم يعطي اذا قيم نسبية متعلقة بحجم معين
- تبدلات عدد الخلايا الدموية يمكن ان يعود:
 - اما الى تبدلات حقيقة للعدد الكلي للخلايا
 - واما الى تبدلات في كمية البلازما: وهكذا فان نقص كمية البلازما يمكن ان يحاكي ارتفاع عدد الكريات الحمر
- هذه الملاحظة الهامة يجب ان تبقى حاضرة دائما في الذهن قبل تفسير تعداد الدم.

طرائق تعداد الدم

• في السابق:

- بتقنية المجهر واستعمال خلايا مسطرة ومدرجة: خلايا Malassez او خلايا Thoma .

• حاليا:

- يجرى التعداد بمساعدة اجهزة آلية تستخدم مبادئ مختلفة
- لكنها ذات دقة عالية لانها تعد جميعها حوالي 10000 خلية
- الاجهزة الآلية الرئيسية هي الاجهزة المسوقة بواسطة شركات Coulter-، Abott، ABX ، Beckman، Sysmex و Bayer-Technicon.
- تجرى الفحوص على عينة دم، غالبا مسحوبة على EDTA والذي يقوم بخلب الكالسيوم. وهذا يجنب تشكل خثرة في الانبوب. وجود خثرة يؤدي الى نتائج خاطئة.
- الاجهزة تعمل على حجم صغير جدا (50 ميكروليتر μ او اقل)
- من الممكن اذا اجراء التعداد على عينات شعرية دقيقة. وهذا مفيد جدا عند الطفل او عند المرضى الذين لديهم صعوبة في الوصول للوريد.

نتائج تعداد الدم

الطفل	المرأة	الرجل	
5-15 000/ mm³	4-10 000/mm ³	4-10 000/mm ³	الكريات البيض
4.5-6 000 0000/mm ³	4-5 500 000/ mm³	4.5-6 000 0000/mm ³	الكريات الحمر
12-14 g/dl	11.5-15 g/dl	13-17 g/dl	الخصاب
0.36-0.44	0.37-0.47	0.40-0.54	الهيماتوكريت
80-100 fl	80-100 fl	80-100 fl	MCV
27-32 pg	27-32 pg	27-32 pg	MCH
30-36 g/dl	30-36 g/dl	30-36 g/dl	MCHC
20-120 000/ mm ³	20-120 000/ mm ³	20-120 000/ mm ³	الشبكيات
140-400 000/ mm ³	140-400 000/ mm ³	140-400 000/ mm ³	الصفائح
2-7500/ mm ³	2-7500/ mm ³	2-7500/ mm ³	PN
40-500/ mm ³	40-500/ mm ³	40-500/ mm ³	PE
10-100/ mm ³	10-100/ mm ³	10-100/ mm ³	PB
3 000-6 000/ mm³	1500-4 000/ mm ³	1500-4 000/ mm ³	Lymphocytes
200-1 000/ mm ³	200-1 000/ mm ³	200-1 000/ mm ³	Monocytes

القيم الطبيعية لعداد الدم عند الرجل، المرأة والطفل

نتائج تعداد الدم

الكريات البيض:

- الجهاز يعطي عدد الكريات البيض في وحدة حجم الدم.
- الصيغة ستسمح لاحقا بتحديد كمية كل واحدة من السلالات.

الكريات الحمر:

- الجهاز يعطي عدد الكريات الحمر في وحدة حجم الدم
- لكن أيضا مناسب(ثوابت) الكريات الحمر:
 - مستوى الخضاب
 - الهيماتوكريت
 - متوسط حجم الكرية
 - متوسط تركيز الخضاب في الكرية
 - و متوسط حمل الكرية من الخضاب
- الاجهزة تقدم ايضا منحنيات توزع حجم الخلايا و مؤشرات التوزع والتي فعليا قليلة الاستعمال في الممارسة.

الصفائح:

- تشير الاجهزة الى عدد الصفائح في وحدة حجم الدم
- ومؤشرات توزع الحجم والابعاد.

صيغة الكريات البيض

هي التوزع بالنسبة المئوية في 5 مجموعات كبيرة للكريات البيض الموجودة عند البالغ الطبيعي:

- عديدات نوى معتدلة
- عديدات نوى حامضية
- عديدات نوى أسسة
- خلايا وحيدة
- خلايا لمفاوية
- الكثير من الاجهزة تجري صيغة الكريات البيض بشكل آلي
- تفسير الصيغة يجب الا ياخذ بالحسبان الا للرقم الكلي لكل مجموعة من الكريات البيض بوحدة الحجم (يعبر عنها/ مثلا، بعدد الخلايا في ملم³)
- مثال: ان التبديل من 40% عديدات نوى معتدلة الى 10% يمكن ان يعود اما الى نقص في عديدات النوى المعتدلة، او الى زيادة مجموعة خلوية اخرى كالخلايا اللمفاوية.
- اذا يجب ان نعتمد دائما على القيم المطلقة المعطاة من الجهاز او المحسوبة اعتبارا من الكريات البيض والنسب المئوية.

اللطخة الدموية

تحضر اللطاخة من قطرة دم ممدودة على شريحة

افضل تقنية هي سحب نقطة دم من الاصبع واجراء مد للخلايا الطازجة

غالبا، ولاسباب عملية، تجرى اللطاخة من نقطة من دم مسحوب في انبوب لاجراء تعداد الدم.

اللطخة يجب ان تمد بشكل صحيح، لتفصل الخلايا جيدا. ثم تجفف دون ان تثبت ثم تلون. الملون الاكثر استعمالا هو ملون May-Grünwald-Giemsa .

ضع الصفيحة
بحيث تاخذ كامل
القطرة

تترك لتتوزع
بشكل متجانس
على طول
الشطبة او تماس
الميلان

قم باجراء حركة نقل
افقي سريعة
محافظة على زاوية
45 ° تقريبا دون
الضغط، على طول
الصفيحة

جفف بالتحريك
لتثبيت مؤقت
للخلايا

اللطاحة الدموية

معلومات مقدمة بواسطة اللطاحة الدموية

• الكريات البيض

- صيغة الكريات البيض من 100 او 200 خلية (نسب مئوية)
- شذوذات شكلية للكريات البيض: يمكن ان تكون تغيرات شكلية للخلايا الموجودة عادة:
 - عديدات نوى ذات نواة غير مفصصة
 - خلايا لمفاوية ذات سيتوبلازما مفرطة الاسسة
 - وجود ارومات بيض ابيضاضية.

• الكريات الحمر: الفحص المجهرى يسمح بالتعرف على شذوذات:

- الحجم: كبر كريات، صغر كريات، تفاوت الكريات
- الشكل: فصيمات كروية، تمنجل الدم... الخ
- التلون: تبكل الكريات او شذوذات مرافقة لتغيرات حجم الكريات الحمر
- اندخالات من منشأ طفيلي او بقايا نووية.

• الصفائح: فحص لطاحة الدم لا يقدم مساعدة كبيرة في اضطراب صفائح الدم

- الشذوذات المصادفة احيانا هي صفائح عملاقة: خلايا تخثرية كبيرة.

تفسير تعداد الدم

- دراسة تحليلية للتبدلات الكمية والكيفية للسلاسل المختلفة
- الوصول الى تشخيص اعتبارا من تجميع هذه التبدلات

تفسير تعداد الدم-الكريات البيض

- زيادة الكريات البيض: ارتفاع مستويات الكريات البيض فوق $10 \times 10^9 / \text{L}$
- نقص الكريات البيض: انخفاض عدد الكريات البيض تحت $4 \times 10^9 / \text{L}$
- زيادة عديدات النوى المعتدلة: ارتفاع مستوى عديدات النوى المعتدلة فوق $7.5 \times 10^9 / \text{L}$
- نقص المعتدلات: انخفاض مستوى عديدات النوى المعتدلة تحت $2 \times 10^9 / \text{L}$
- زيادة الحامضات: ارتفاع مستوى عديدات النوى الحامضية فوق $0.5 \times 10^9 / \text{L}$
- نقص الحامضات: غياب او انخفاض شديد لعدد عديدات النوى المعتدلة (تحت $0.04 \times 10^9 / \text{L}$)
- زيادة عديدات النوى الاسسة: لا يوجد راي متفق ليه حول الرقم الاعظمي. نقص عدد عديدات النوى الاسسة؟
- زيادة الخلايا اللمفاوية في الدم: ارتفاع مستوى الخلايا اللمفاوية فوق $4 \times 10^9 / \text{L}$
- نقص اللمفاويات: انخفاض مستوى الخلايا اللمفاوية تحت $1.5 \times 10^9 / \text{L}$
- زيادة الوحيدات في الدم: ارتفاع عدد الخلايا الوحيدة الدموية فوق $1 \times 10^9 / \text{L}$
- نقص الوحيدات: انخفاض مستوى الخلايا الوحيدة تحت $0.2 \times 10^9 / \text{L}$
- وجود غير الطبيعي في الدم لبعض الخلايا النقية: خليفة النقية، النقية وحتى سليفة النقية. وجود هذه الخلايا يدعى نقوية الدم. وهي ليست ذات قيمة الا اذا كانت اكثر من 5% من الكريات البيض.
- وجود خلايا مرضية في الدم: ارومات البيض الابيضاضية، خلايا لمفاوية سرطانية.

تفسير تعداد الدم- الكريات الحمرة

يشمل تعداد الدم 6 متغيرات هامة:

- عدد الكريات الحمراء
 - مستوى الخضاب
 - يقاس بواسطة الجهاز بقنية لونية
 - تحدد كمية خضاب الكريات الحمراء الموجودة في حجم من الدم
 - يعبر عنها عادة عكس التوصيات العالمية، ب غ/دل
 - الهيماتوكريت
 - يمثل الهيماتوكريت الحجم الذي تشغله الكريات الحمراء في حجم معين من الدم.
 - يعبر عنه الهيماتوكريت بنسبة مئوية او ب |/|
 - يمكن ان يقاس مباشرة دون جهاز بعد تنبيذ بسيط للدم(التخدير والانعاش: هيماتوكريت دقيق وريدي)
 - الاجهزة الآلية الحالية لاتقيس الهيماتوكريت: في معظم الوقت هي تحسبه.
- الهيماتوكريت ومستوى الخضاب هما العنصران الاكثر اهمية لوضع تشخيص فقر دم

تفسير تعداد الدم- الكريات الحمراء

متوسط حجم الكرية الحمراء MCV

- هذه القيمة تمثل الحجم الوسطي لكرية حمراء
- كانت في السابق تحسب بالصيغة التالية:

متوسط حجم الكرية الحمراء = الهيماتوكريت / عدد الكريات الحمراء

- الاجهزة الحالية تقيس مباشرة الحجم الوسطي للكريات الحمراء ثم تحسب الهيماتوكريت بضرب الحجم الوسطي للكرية الحمراء بعدد الكريات الحمراء
- زيادة حجم الكرية الوسطي يدعى كبر الكريات
- نقص هذا الحجم الكريوي الوسطي يسمى صغر كريات.
- حمل الكرية الوسطي من الخضاب (يسمى ايضا محتوى وسطى من الخضاب في الكرية) MCH
- وزن الخضاب في كل كرية حمراء، تحسب بالصيغة التالية:

متوسط حمل الخضاب في الكرية الحمراء = الخضاب / عدد الكريات الحمراء

وسطى تركيز الخضاب في الكرية (MCHC)

هو الحجم الذي يشغله الخضاب في كرية حمراء. وهو يعبر عنه اذا بنسبة مئوية او بليتر بالليتر.

متوسط تركيز الخضاب في الكرية الحمراء = الخضاب / الهيماتوكريت

- MCHC لا يمكن ان يزداد
- كل زيادة اعلى من 36% تتعلق عادة بخطا تقني: سوء ضبط الجهاز، او تداخلات.

تفسير تعداد الدم - صفيحات

• الرقم الطبيعي للصفائح هو من 150-400 $\times 10^9$ /ل (150 000 - 400 000 /ملم³)

• انخفاض عدد الصفائح يدعى قلة الخلايا التخثرية thrombocytopenie او قلة الصفائح thrombopénie.

• ارتفاع عدد الصفائح يسمى كثرة الخلايا التخثرية thrombocytose.

• يوجد سبب للخطأ بالنسبة لنقص الخلايا التخثرية:

• وجود خثرة في الانبوب

• لدى بعض الافراد، مضاد التخثر المستعمل في تعداد الدم (EDTA) يحدث تجمع للصفائح والذي يجعلها تترسب اذا في الانبوب. هذا يعطي نقص صفائح كاذب.

• من الضروري اذا امام نقص صفائح اجراء تحقق من عدد الصفائح على مضاد تخثر آخر: سيترات ، هيبارين.

مخطط النقي MYELOGRAMME

- دراسة خلوية لنقي العظم
- فحص السائل النقي المسحوب بالبرز
- يقدم معلومات كيفية لكن ايضا عن تغيرات في عدد الخلايا بعضها لبعض
- اقل دقة لتقدير كمي للتبدلات الخلوية.
- أ-اجراء مخطط النقي:
 - على مستوى القص: مخطط قصي هو المستعمل غالبا
 - او على مستوى عظم الحرقفة: مخطط حرقفي :
 - عند الطفل
 - عند استحالة بزل القص او عدم القدرة على تفسيره
- الميزل المستخدم لمخطط النقي يدعى ميزل Malarme
- تقنية مثالية لاخذ اقل مايمكن من عصارة النقي
- الكميات الكبيرة تحمل بالفعل كمية اكبر بكثير من الخلايا الدموية ومن هنا عامل تمديد مزعج للتفسير
- السائل المسحوب بالبرز يمد فورا على صفيحة زجاجية ثم يجفف بالهواء الحر. ثم يلون فيما بعد.
- التلوين الذي يفضل استخدامه هو May Grunwald Giemsa.
- في بعض الحالات: تقنيات كيميائية خلوية تعلم بشكل نوعي بعض انواع الخلايا
 - تفاعل كيميائي مستخدم كثيرا هو تفاعل بيرل الذي يسمح بتسليط الضوء على وجود الحديد في الخلايا.

تفسير مخطط النقي

> 2%	خلايا جذعية غير متميزة
50-70%	سلالة المحببات
	معدلات
> 3%	-ارومات نقوية
> 5%	-خلايا سليفة نقوية
5-20%	-خلايا نقوية
5-20%	-خلايا خليفة نقوية
10-25%	-عيدات نوى
> 4%	حامضيات واسسات
10-30%	السلالة المولدة للكريات الحمر
0-2%	سليفة ارومات الحمر
2-4%	ارومات حمر اسسة
4-8%	ارومات حمر متعددة التلون
3-6%	ارومات حمر حامضية
موجودة	سلالة خلايا النواعات
	خلايا النواعات
2-5%	خلايا جذعية غير متميزة

- النتائج بشكل نسبة مئوية
- غنى نقي العظم:
- كثافة خلوية تتدرج من 0 الى 5
- او تقييم بصفات (ضعيف، متوسط، قوي)

تفسير مخطط النقي

السلالة المولدة للكريات الحمر

- تمثل عادة اقل من ثلث الخلايا المنواة لنقي العظم
- المراحل المختلفة للنضج يمكن ان تميز:
- ارومات حمر أسسة، متعددة التلون، حامضية.
- تبدلات شكلية : أرومات ضخمة ، وجود تبدلات نووية او اندخالات سيتوبلازمية من نوع اجسام جولي Jolly.

سلالة الخلايا المحببة

- النسبة المئوية للحايا المحببة: غالباً 50-70% من نقي العظم
- عد حسب مرحلة النضج: ارومة نقوية، خلية سليفة نقوية، خلية نقوية، خلية خليفة نقوية
- يكشف تبدلات كيفية عديدة:
- لاتزامن في النضج
- زيادة الخلايا الشابة.
- الخلايا البيض الاخرى اقل اهمية كمياً:
- الخلايا للمفاوية: 5-20% من الخلايا النقوية
- الخلايا البلازمية : اقل من 4%
- الخلايا الوحيدة نادراً ماتعد وهي ضعيفة التمثيل لدى الشخص البالغ الطبيعي.
- البحث عن وجود خلايا بيضاء غير طبيعية:
- ارومات بيض لابيضاض الدم الحاد
- خلايا لمفاوية للمفوما

تفسير مخطط النقي

• سلالة الصفائح:

• قليلة الاهمية كميًا

• التعرف عليها سهل جدا على مخطط النقي

• غنى تانقي بخلايا النواءات

• تبدلات شكلية لسلالة النواءات: عسر تكون الصفائح، وجود نواءات دقيقة.

• ان دراسة النقي يجب ان تبحث بانتباه عن وجود خلايا مرضية.

من المهم ان يجرى مخطط النقي بشكل متقن: تقنية سيئة تجعل اللطاخة غير قابلة للتفسير او حتى يمكن ان تؤدي

لاخطاء تشخيصية خطيرة.

Myéloblaste

Promyélocyte

Myélocyte

Métamyélocyte

خزعة النقي

- فحص تشريحي-مرضي
- دراسة الهندسة المعمارية لنقي العظم
- هي اقل دقة من مخطط النقي في التعرف على المجموعات النقية المختلفة
- تجرى بمبزل Jamshidi او Tanzer، او بمبازل مشتقة
- تحت تخدير موضعي
- على مستوى عظم الحرقفة
- تتطلب مهارة تقنية جيدة من القائم بها وعقامة صارمة
- العينة تثبت فوراً (فورمول) ثم ترسل الى مخبر التشريح المرضي:
- يزال منها الكلس قبل ان تعامل ككل عينات التشريح المرضي
- مع اجراء مقاطع رقيقة ثم تلويينات مختلفة.

مظهر العينة:

- حواجز عظمية تفصل المناطق المكونة للدم
- عدد كبير من المساحات الفارغة التي تتعلق بالخلايا الشحمية (كون الشحم قد انحل بالنتثبيت والتلوين)
- بين هذه المساكن الشحمية يمكن ان نميز الخلايا المكونة للدم:
- في بعض الامراض، المساكن الشحمية تتسع او تمتد: نتحدث عن تطور شحمي لنقي العظم كما في **عدم تنسج نقوي**
- في امراض اخرى على العكس، هذه المساكن العظمية تختفي: فرط تصنع نقوي يمكن ان يتعلق بنتناذر نقوي تكاثري.
- في بعض الحالات نلجا الى تلويينات نوعية: الاكثر استعمالا تلوين الياف الريتيكولين **fibres de réticuline** : **تليف النقي**.
- تسمح خزعة نقي العظم بالتعرف على وجود ارتشاحات بخلايا مرضية، لمفوما او سرطانية.

دراسة العقدة اللمفاوية

دراسة خلوية

- بزل خلوي بسيط للعقدة اللمفاوية
- يجب ان يستخدم ويفسر بحذر كبير
- لايقدم معلومات باي حال عن نسيج العقدة اللمفاوية
- استطبباته محدودة جدا
- ليس اختبار تشخيص بل فحص موجه بل حتى في بعض الحالات لمراقبة مرض معروف.
- البزل الخلوي FNA هو فحص صعب.
- لايجب باي حال محاولة سحب العصارة العقدية لانه يوجد فورا تمدد بالدم
- الخلايا يجب ان تصعد بالخاصية الشعرية في ابرة مزروعة داخل العقدة
- الكمية القليلة جدا من العصارة العقدية المسحوبة ستوضع لاحقا على صفيحة وتمد وتلون ب .MGG.

البصمة العقدية

- اكثر اهمية بكثير لكنه يتطلب خزعة من العقدة
- مساعد ممتاز لفحص التشريح المرضي المجري على خزعة
- تسمح احيانا بتمييز افضل للمجموعات الخلوية اللمفاوية المرضية

خزعة العقدة

- هو فحص تشريح مرضي تقليدي.
- من المهم الطلب من الجراح الذي يستخرج العقدة بقطع العقدة واجراء بدائل.(عدة عينات).

فحوصات أحرى

التدفق الخلوي FLOW CYTOMETRY

- وصم الخلايا الدموية بمساعدة اعداد وحيدة نسيلة متألقة، يتعرف الجهاز بعدها على الخلايا الموصومة بهذه الاضداد.
- يطبق التدفق الخلوي بشكل اساسي:
 - عد الخلايا الشبكية
 - دراسة المجموعات الفرعية للخلايا للمفاوية: مثل عد الخلايا للمفاوية CD4, CD8 في اطار مرض HIV
 - دراسة امراض الدم الخبيثة: من المهم اجراء تنميط مناعي جيد للخلايا الابيضاضية لحظة التشخيص لان هذا يمكن ان يكون عنصرا مهما للمتابعة.
 - تقنيات اخرى قيد التطوير: دراسة تفعيل الصفائح، اثبات وجود اعداد مثبتة على الصفائح.

الوراثة الخلوية Cytogenetics

- مكمل هام للدراسة الخلوية في بعض امراض الدم: ابيضاضات نقوية مزمنة، ابيضاضات حادة.
- التقنيات تستخدم الزرع الخلوي
- يمكن ان تجرى على خلايا دم ابيضاضية، على خلايا نقوية تم الحصول عليها عند اجراء مخطط النقي او على خلايا عقدية لامراض الدم الخبيثة
- من المهم اعلام اخصائي الوراثة الخلوية عن مصدر العينة، نمط الخلايا التي نرغب الحصول على دراسة صبغية لها
- في الدمويات تجرى على الخلايا الورمية (ابيضاضية، لمفوماوية).
- تؤكد تبدلات خلوية وراثية مكتسبة للسلالة المدروسة، المختلفة كثيرا عن التبدلات المصادفة في الامراض الخلوية والتي تحملها كل الخلايا البدنية.

فحوصات أحرى

البيولوجيا الجزيئية

- تطبق تقنيات البيولوجيا الجزيئية بشكل متزايد في الدمويات وبشكل خاص لامراض الدم الخبيثة
- التطبيقات الاساسية:
- المساعدة على التشخيص في الامراض المكتسبة(ابيضاض نقوي مزمن، بعض الابيضاضات الحادة، بعض اللمفومات).
- خارج الدمويات الخلوية: الهيموفيليا، امراض الخضاب، الاستعداد للتخثر.

تحاليل وظيفية للمجموعات الخلوية المختلفة

يتوفر اختبارات كثيرة جدا لدراسة وظائف عديدات النوى المعتدلة، الصفيحات والكريات الحمر.

الدراسة بالنظائر

- يتناقص استعمالها في الدمويات لانها طويلة ومكلفة
- يمكن ان نحدد بمساعدة نظائر:
- متوسط عمر الكريات الحمر ومكان تخربها
- او متوسط عمر الصفيحات والمكان الرئيسي لتخربها

هناك عدد كبير من الفحوص اكثر فاكثر دقة في الدمويات. المهم هو استخدام هذه الفحوصات بشكل صحيح وبالتالي ان نعرف جيدا حدود قيمة هذه الفحوصات واستطاباتها.