

لنسلم تصميم مقرر الإنتاج أنظار طبيب لطبيب السفة
الخامسة / مخدرات / قسم الدكتور همام مؤمن مؤمن

بنت - انقل رقم المجلة إلى ورقة الإجابة وأجب بهي أو خطاً ثم علك
السبب (18) ورقة - لكل إجابة صحيحة نصف علامة
والنقل علامة.

- ١- (ص ١٥) - لكي تحمي الحلمات من الاقتران والتمزق أثناء القيام باللبنة الأولى.
- ٢- (ص ١٥) - لا نه الحامة تنشأ من برعم وتظهر من البرعم استطالة واحدة رئيسية وتكون من هذه الاستطالة فتحة بنزلية الطامة .
- ٣- (ص ١٥) - (خطأ) يمر ببطء لكي يحدث التبادل الخلوي وينسج الجبال بانتقال مكونات الحليب من الدم إلى حويصلات الصدر .
- ٤- (ص ١٥) - (خطأ) - لا ينتقل حرض الكرب الصدر من داخل الأرباع لأنه كل ربع مفعول من الأضرب ينسج هناك لا يسمى بانتقال المسيمات المرضية من الداخل .
- ٥- (ص ١٥) - بسبب زيادة رشح السائل اللعافوي من الشعيرات الدموية منحه الصدر قبل الولادة بيوم أو يومين وفوق ذلك إلى حدوث العوزة .
- ٦- (ص ١٥) - (ص ١٥) - لا نه الريلا كسبه يعمل على نمو القنوات اللبنية بعبورة مستمرة أما الاستروميه ينشأ تفرع القنوات اللبنية وتشعبها .
- ٧- (خطأ) - تتواجد بكيمات كثيرة ، لا نه الإحجام المبتكر كونه ذرية مهمانغ للطاقة اللازمة لبناء وتكوين الحليب .
- ٨- (ص ١٥) - لكي تحمي الحليب المخزن في مخزن القناة من تكتثر البكتريا المرضية .

٩- (مير) - لتجنب حدوث إمتقان وتقرصه أنسجة الحامة التي تكون غنية بالشيخيرات الدموية ومزيج الدم من الحامة.

١٠- (مظنا) - لتدوير لونه هذا الطرود مسئول عنه هيئته الماريا المفترزة للحليب وسلاصته وعلاقتها ببعض العين.

١١- (مير) - بسبب انتقال سديم البوصين وبروتينات الحامة منه الدم إلى الطرود قبل ولادة الفلانة مباشرة.

١٢- (مير) - لونه ملبس بالماء ليس يكونه غنة تركيز اللوليمسقول منخفض (0.214%) مقابل (0.288%) عند الترأقار.

١٣- (١.٥) درجة العمل بعداد مبيد نصف درجته.

١٤- تأثير الطعنة ١ - تأثير العزلة التي ولهم المعارة ٢ - تأثير حالة الشياح ٣ - تأثير الحمل ٤ - التأثيرات الفردية ٥ - استمرارية إنتاج الحليب (القبائية) ٦ - تأثير عمر ووزن الشاكر عند أول ولادة ٧ - تأثير مرحلة إنتاج الحليب وخصائص الحليب ٨ - تأثير الحالة الصحية للحيوان.

١٥- (4) درجات موزعة كالتالي:

١- مرحلة الدامع النشطة: وتبدأ مع توقف عملية الحلاية وتنتهي بعد نحو (٥٠) يوماً ويحدث إمتقان بالضرع ثم انقضاء المفرازات

٢- مرحلة الدامع الساكنة: يرتفع طول هذه الفترة بطول مدة التجفيف والتي تعرف بفترة الرأفة.

٣- مرحلة السجوب وإنتاج الحليب: التي تستغرق بين (15- ٤٥) يوماً قبل الولادة وتتميز بعمليات التعديد النشطة التي تعرف بمرحلة ١٦ لكل السجوب وبعد إفراز الحليب.

ب) - (5) درجات : لقد تعدد محبوسو درجة واحدة

- ١٥ - يعمل على نمو المركز الفدي في طبانة الرصم .
- ٢٥ - مبروريت للنفثتين واستمرارية الحمل ووقف الشياخ .
- ٣٥ - يعمل على نمو النسج في الفدي في المبرور .

ب) - (5.5) درجة موزونة كما يلي :

- * لا يعمل المبرور في القدرة على طبانة المعادن وتنقل المعادن
- (٢) الموجودة بالجليب من الدم عبر الغشاء القاعدي للخلايا الإفرازية بطرائق فعالة وأخرى غير فعالة ولا تتطلب طاقة .
- * تنقل المعادن الكبرى مثل Ca و M الى طبانة الحوصلات
- (١٥) بطريقة الانتشار حيث يكون تركيزها داخل الخلية أعلى مما هو عليه في طبانة الحوصلات .
- * أما العناصر الصغرى مثل النيوبيات، البروم، اليود، الحديد
- (٢) والزنك والزنك ترتبط مع بروتينات الدهن بالجليب وتخترق الغشاء القاعدي للخلايا الإفرازية الى طبانة الحوصلات

انتهت الإجابة
أ. د. هادي محمد
مكي